

エルニーニョ監視速報（No. 374）について 2023 年 10 月の実況と 2023 年 11 月～2024 年 5 月の見通し

- 今年の春からエルニーニョ現象が続いている。
- 今後、来年の春にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い（80％）。

今年の春に発生したエルニーニョ現象が続いています。
今後、来年の春にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い（80％）と予測しています。

以上を内容とする「エルニーニョ監視速報（No. 374）」を本日 14 時に発表しました。

エルニーニョ（ラニーニャ）現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高く（低く）なり、その状態が 1 年程度続く現象です。エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、日本を含め世界中の異常な天候の要因となり得ると考えられています。このため気象庁では、エルニーニョ現象やラニーニャ現象など熱帯域の海洋変動を監視するとともに、それらの実況と見通しに関する情報を「エルニーニョ監視速報」として毎月 1 回（10 日頃に）発表しています。

問合せ先：大気海洋部 気候情報課 担当 榎田

電話 03-6758-3900（内線 4546）

エルニーニョ監視速報 (No. 374)

2023 年 10 月の実況と 2023 年 11 月～2024 年 5 月の見通し

- 今年の春からエルニーニョ現象が続いている。
- 今後、来年の春にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い（80％）。




図 1 エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値との差の 5 か月移動平均値
8 月までの経過（観測値）を折れ線グラフで、大気海洋結合モデルによる予測結果（70%の確率で入ると予想される範囲）をボックスで示している。指数が赤／青の範囲に入っている期間がエルニーニョ／ラニーニャ現象の発生期間である。エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値はその年の前年までの 30 年間の各月の平均値。

エルニーニョ／ラニーニャ現象の発生確率 (予測期間:2023 年 9 月～2024 年 3 月)

年	月	平均期間		
2023 年	9 月	2023 年 7 月 ～ 2023 年 11 月	100	
	10 月	2023 年 8 月 ～ 2023 年 12 月	100	
	11 月	2023 年 9 月 ～ 2024 年 1 月	100	
	12 月	2023 年 10 月 ～ 2024 年 2 月	100	
2024 年	1 月	2023 年 11 月 ～ 2024 年 3 月	90	10
	2 月	2023 年 12 月 ～ 2024 年 4 月	90	10
	3 月	2024 年 1 月 ～ 2024 年 5 月	80	20

■エルニーニョ現象 ■平常 ■ラニーニャ現象

図 2 5 か月移動平均値が各カテゴリー（エルニーニョ現象／平常／ラニーニャ現象）に入る確率（％）
エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値との差の 5 か月移動平均値が $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上／ $-0.4^{\circ}\text{C} \sim +0.4^{\circ}\text{C}$ ／ -0.5°C 以下の範囲に入る確率を、それぞれ赤／黄／青の横棒の長さで月ごとに示す。気象庁の定義では、5 か月移動平均値が $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上（ -0.5°C 以下）の状態が 6 か月以上持続した場合にエルニーニョ（ラニーニャ）現象の発生としているが、エルニーニョ監視速報においては速報性の観点から、実況と予測を合わせた 5 か月移動平均値が $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上（ -0.5°C 以下）の状態が 6 か月以上持続すると見込まれる場合に「エルニーニョ（ラニーニャ）現象が発生」と表現している。

【解説】

エルニーニョ／ラニーニャ現象

- **10月の実況:**今年の春からエルニーニョ現象が続いている。10月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は $+2.2^{\circ}\text{C}$ で、8月と9月と同じ値となり、基準値より高い値だった（図3、表）。エルニーニョ現象発生の判断に使用している5か月移動平均値の8月の値は $+1.9^{\circ}\text{C}$ で、上昇傾向が続いている（図1、表）。太平洋赤道域の海面水温は日付変更線付近から東部を中心に平年より高かった（図4、図6）。海洋表層の水温は太平洋赤道域の日付変更線付近から東部を中心に平年より高かった（図5、図7）。太平洋赤道域の日付変更線付近から東部の対流活動は平年より活発で、中部太平洋赤道域の大気下層の東風（貿易風）は平年より弱かった（図8、図9、図10）。このような太平洋赤道域の海洋と大気の状態は、エルニーニョ現象時の特徴を示している。以上から、今年の春からエルニーニョ現象が続いている。
- **今後の見通し:**今後、来年の春にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い（80％）。実況では、太平洋赤道域の中部から東部にみられる海洋表層の暖水（図5）が、東部の海面水温が高い状態を維持している。大気海洋結合モデルは、太平洋赤道域の中部から東部にかけて海洋表層の暖水の東進が続き、予測期間中、エルニーニョ監視海域の海面水温が基準値より高い値で推移する可能性が高いと予測している（図11）。以上のことから、今後、来年の春にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い（80％）。

西太平洋熱帯域及びインド洋熱帯域の状況

- **西太平洋熱帯域:**10月の西太平洋熱帯域の海面水温は、基準値に近い値だった（図3）。今後、春にかけて基準値に近い値か基準値より低い値で推移すると予測される（図12）。
- **インド洋熱帯域:**10月のインド洋熱帯域の海面水温は、基準値に近い値だった（図3）。今後、冬にかけて基準値より高い値となり、春も基準値より高い値で推移すると予測される（図13）。

10月の日本と世界の天候への影響

- **日本:**エルニーニョ現象時の特徴は明瞭には見られなかった。今後の日本の天候については、最新の季節予報を参照されたい。
- **世界:**マダガスカル周辺、東南アジア、南米北部～中部太平洋熱帯域の高温、東南アジア南部～オーストラリアの少雨が、エルニーニョ現象時の特徴に一致していた。

エルニーニョ／ラニーニャ現象の発生確率値（図2）と主文における見通しの表現

* エルニーニョ／ラニーニャ現象の発生や持続の見通しについては、季節単位で記述することとし、原則として、現象の発生を記述する場合はその季節の最後の月の発生確率値を、現象の持続を記述する場合はその季節の最初の月の発生確率値を用いて下表のように表現する。ただし、発生確率値の推移によってはこの原則を用いないことがある。

	発生確率			主文における表現（発生確率は例）
	エルニーニョ現象	平常	ラニーニャ現象	
エルニーニョ現象の発生（持続）	50％以上	30％以下		エルニーニョ現象が発生する（続く）可能性が高い（50％）。
	60％	40％	0％	平常の状態が続く（になる）可能性もある（40％）が、
	50％	40％	10％	エルニーニョ現象が発生する（続く）可能性の方がより高い（60％）。
	50％	50％	0％	エルニーニョ現象が発生する（続く）可能性と
	40％	40％	20％	平常の状態が続く（になる）可能性が同程度である（50％）。
	40％	50％	10％	エルニーニョ現象が発生する（続く）可能性もある（40％）が、
ラニーニャ現象の発生（持続）		30％以下	50％以上	ラニーニャ現象が発生する（続く）可能性が高い（50％）。
	0％	40％	60％	平常の状態が続く（になる）可能性もある（40％）が、
	10％	40％	50％	ラニーニャ現象が発生する（続く）可能性の方がより高い（60％）。
	0％	50％	50％	ラニーニャ現象が発生する（続く）可能性と
	20％	40％	40％	平常の状態が続く（になる）可能性が同程度である（50％）。
	10％	50％	40％	ラニーニャ現象が発生する（続く）可能性もある（40％）が、
平常の状態への移行（持続）		60％	40％	平常の状態が続く（になる）可能性の方がより高い（60％）。
	30％以下	50％以上	30％以下	平常の状態になる（が続く）可能性が高い（50％）。

【監視・予測資料】

2023 年 10 月における赤道域の海洋と大気の状態

1. エルニーニョ監視指数（図 3、表）

エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値との差は $+2.2^{\circ}\text{C}$

エルニーニョ現象等監視海域
NINO.3: エルニーニョ監視海域
NINO.WEST: 西太平洋熱帯域
IOBW: インド洋熱帯域

(a) エルニーニョ監視海域の
海面水温の基準値 * との差
($^{\circ}\text{C}$)

NINO.3

(b) 南方振動指数 **

TAHITI - DARWIN

(c) 西太平洋熱帯域の海面
水温の基準値 * との差 ($^{\circ}\text{C}$)

NINO.WEST

(d) インド洋熱帯域の海面
水温の基準値 * との差 ($^{\circ}\text{C}$)

IOBW




図 3 各監視指数の最近 10 年間の経過

折線は月平均値、滑らかな太線は 5 か月移動平均値を示す。赤色の陰影はエルニーニョ現象の発生期間を、青色の陰影はラニーニャ現象の発生期間を示している。

* 基準値は、その年の前年までの 30 年間の各月の平均値（(c) 西太平洋熱帯域、(d) インド洋熱帯域では、30 年間の変化傾向による上昇分を加えている）。

** 南方振動指数はタヒチとダーウィン（TAHITI と DARWIN; 上図に位置を示した）の地上気圧の差を指数化したもので、貿易風の強さの目安の 1 つであり、正（負）の値は貿易風が強い（弱い）ことを表している。指数の算出に用いた気圧の平年値は 1991～2020 年の 30 年平均値。

表 エルニーニョ監視海域の海面水温と南方振動指数の最近 1 年間の値

5 か月移動平均値の下線部は $+0.5^{\circ}\text{C}$ 以上となった月を、斜字体は -0.5°C 以下となった月を示す。

海面水温と南方振動指数の最新月は速報値である。

	2022 年		2023 年									
	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
月平均海面水温 ($^{\circ}\text{C}$)	24.1	24.3	25.1	26.3	27.7	28.1	28.2	27.9	27.6	27.3	27.1	27.2
基準値との差 ($^{\circ}\text{C}$)	-0.9	-0.8	-0.4	0.0	+0.5	+0.5	+1.1	+1.3	+1.8	+2.2	+2.2	+2.2
5 か月移動平均 ($^{\circ}\text{C}$)	-0.8	-0.6	-0.3	0.0	+0.3	<u>+0.7</u>	<u>+1.0</u>	<u>+1.4</u>	<u>+1.7</u>	<u>+1.9</u>		
南方振動指数	+0.2	+1.8	+1.0	+1.0	-0.1	+0.3	-2.3	+0.5	-0.6	-1.2	-1.3	-0.4

2. 海洋（図4～図7）

太平洋赤道域の海面水温は、日付変更線付近から東部を中心に平年より高い




図4 2023年10月の海面水温図（上）及び平年偏差図（下）

海面水温図の太線は5°C毎、細線は1°C毎の、平年偏差図の太線は1°C毎、細線は0.5°C毎の等値線を示す（平年値は1991～2020年の30年平均値）。




図5 2023年10月のインド洋から太平洋の赤道に沿った水温（上）及び平年偏差（下）の断面図

上図は太線が5°C毎、細線が1°C毎の等値線を示し、下図は太線が1°C、細線が0.5°C毎の等値線を示す（平年値は1991～2020年の30年平均値）。図中白く抜けている部分は陸地である。




図 6 インド洋から太平洋の赤道に沿った海面水温
年偏差の経度-時間断面図

太線は 1°C 毎、細線は 0.5°C 毎の等値線を示す（平
年値は 1991～2020 年の 30 年平均值）。図中白く抜け
ている部分は陸地である。




図 7 インド洋から太平洋の赤道に沿った海面から深
度 300m までの平均水温年偏差の経度-時間断面図

太線は 1°C 毎、細線は 0.5°C 毎の等値線を示す（平
年値は 1991～2020 年の 30 年平均值）。図中白く抜け
ている部分は陸地である。

3. 大気（図 8～図 10）

中部太平洋赤道域の大気下層の東風（貿易風）は平年より弱い




図 8 日付変更線付近の OLR 指数（OLR-DL）、対流圏上層（200hPa）の赤道東西風指数（U200-CP）、対
流圏下層（850hPa）の赤道東西風指数（U850-CP）、インド洋における対流圏上層（200hPa）の赤道東西風指数
（U200-IN）の時系列（上から順に）

折線は月平均値、滑らかな太線は 5 か月移動平均値を示す（平年値は 1991～2020 年の 30 年平均值）。赤色の陰影はエル
ニーニョ現象の発生期間を、青色の陰影はラニーニャ現象の発生期間を示している。OLR データは米国海洋大気庁
（NOAA）から提供されたものである。令和 5 年 10 月 11 日発表のエルニーニョ監視速報（No.373）より新しいデータ
に切り替えた。




図 9 外向き長波放射量 (OLR) (上) 及び年偏差 (下) の分布図 (2023 年 10 月)

OLR の値が小さいほど、対流活動が活発であることを示しており、上図では 220W/m^2 以下の領域に青の陰影を施している。下図では OLR が年偏差より小さく、対流活動が活発な領域に青の陰影を、OLR が年偏差より大きく、対流活動が不活発な領域に緑～黄～赤の陰影を施している（年偏差は 1991～2020 年の 30 年平均値）。上図は 20W/m^2 毎、下図は 10W/m^2 毎に等値線を描いている。OLR データは米国海洋大気庁（NOAA）から提供されたものである。令和 5 年 10 月 11 日発表のエルニーニョ監視速報 (No.373) より新しいデータに切り替えた。




図 10 赤道付近における対流圏上層 (200hPa) の速度ポテンシャルの年偏差 (a) 及び対流圏下層 (850hPa) の東西風速の年偏差 (b) の経度-時間断面図

(a) 等値線の間隔は $2 \times 10^6 \text{m}^2/\text{s}$ で、年よりも発散が強く、対流活動が活発な領域に青の陰影を、年よりも発散が弱く、対流活動が不活発な領域に緑～黄～赤の陰影を施している。(b) 等値線の間隔は 1.5m/s で、西風偏差の領域には緑～黄～赤の陰影を、東風偏差の領域には青の陰影を施している（両者の年偏差は 1991～2020 年の 30 年平均値）。

2023 年 11 月～2024 年 5 月の海面水温予測 (大気海洋結合モデルによる)

エルニーニョ監視海域の海面水温は、今後、春にかけて基準値より高い値で推移すると予測




図 11 エルニーニョ監視海域の月平均海面水温の基準値との差の先月までの経過（折れ線グラフ）と大気海洋結合モデルから得られた今後の予測（ボックス）

各月のボックスは、海面水温の基準値との差が 70% の確率で入る範囲を示す。




図 12 西太平洋熱帯域の月平均海面水温の基準値との差の先月までの経過（折れ線グラフ）と大気海洋結合モデルから得られた今後の予測（ボックス）

各月のボックスは、海面水温の基準値との差が 70% の確率で入る範囲を示す。




図 13 インド洋熱帯域の月平均海面水温の基準値との差の先月までの経過（折れ線グラフ）と大気海洋結合モデルから得られた今後の予測（ボックス）

各月のボックスは、海面水温の基準値との差が 70% の確率で入る範囲を示す。

エルニーニョ現象などの情報は気象庁ホームページでもご覧になれます。

(<https://www.data.jma.go.jp/cpd/elnino/>)

来月の発表は、12 月 11 日 14 時の予定です。
内容に関する問合せ先：気候情報課
(電話 03-6758-3900 内線 4546)